



Meteorologisk
institutt

METinfo

No. 9/2026
ISSN 1894-759X
KLIMA
Oslo, 02.10.2026

Været i Norge

Klimatologisk månedsoversikt
September 2026

Reidun Gangstø, Helga Therese Tilley Tajet, Ketil Tunheim og Signe Aaboe





Tuddal, slutten av september 2026. Foto: Anniken Sanna

Klimatologisk månedsoversikt

September 2026

Nedbør

Utjevnet nedbørsum
i prosent av normal




Klimatologisk månedsoversikt

September 2026

Nedbør

Klassifisering av nedbør mot
persentiler i referanseperioden
1991-2020





Klimatologisk månedsoversikt

September 2026

Lufttemperatur

Utjevnet avvik i °C fra
normal månedstemperatur



Normalperioden er 1991 - 2020


Klimatologisk månedsoversikt

September 2026

Lufttemperatur

Klassifisering av temperatur mot
persentiler i referanseperioden
1991-2020

- Ekstremt kaldt
- Svært kaldt
- Kaldt
- Normalt, kjølig
- Normalt, mild
- Varmt
- Svært varmt
- Ekstremt varmt



Normalperioden er 1991 - 2020

September 2026: En vanlig septembermåned

Landstemperaturen endte 0,7°C over normalen, som tilsvarer den 14. varmeste september i en måleserie som går tilbake til 1901. Landsnedbøren var 10 % mer enn normalt, som tilsvarer den 43. våteste september i måleserien.

Lufttemperatur

Klassifikasjonen viser at september var for det meste "Varm" eller "Normal, mild", med innslag av noen mindre områder med "Svært varm" og "Normal, kjølig". Landstemperaturen endte 0,7 °C over normalen, og måneden ble den 14. varmeste som er registrert i en måleserie som går tilbake til 1901. I denne serien er september 2016 varmest med 2,4 °C over normalen, mens 1986 er kaldest med 3,4 °C under normalen. Avvikene i årets september varierte fra mer enn 2 °C over normalen på et par stasjoner i Telemark og Nordland, til 1,4 °C under normalen på en stasjon i Vestland.

Det ble ikke slått noen rekorder for temperatur. De varmeste stasjonene var:

- 27500 Færder Fyr (Færder, Vestfold) 15,0 °C (1,0 °C over normalen)
- 29950 Svenner Fyr (Larvik, Vestfold) 14,8 °C (1,1 °C over normalen)
- 17000 Strømtangen Fyr (Fredrikstad, Østfold) 14,7 °C (1,1 °C over normalen)

Høyeste maksimumstemperatur var 26,2 °C, og ble registrert den 30. på 50540 Bergen - Florida (Bergen, Vestland). Dette ble årets varmeste dag i Bergen. Gjennomsnittet av høyeste temperatur i Norge i september i normalperioden 1991-2020 er 25,2 °C.

De kaldeste stasjonene var:

- 15270 Juvvasshøe (Lom, Innlandet) 1,4 °C (0,5 °C over normalen)
- 55425 Spørteggbu (Luster, Vestland) 2,1 °C (0,5 °C over normalen)
- 31970 Gaustatoppen (Tinn, Telemark) 2,2 °C (1,0 °C over normalen)

Laveste minimumstemperatur var -7,1 °C, og ble registrert den 14. på 9160 Folldal - Fredheim (Folldal, Innlandet). Gjennomsnittet av laveste temperatur i Norge i september i normalperioden 1991-2020 er -8,8 °C.

*To andre stasjoner i nærheten, Juvflye Bh1 og Juvflye - Klimapark 2469, var også blant de tre kaldeste, men ble utelatt her fordi de er veldig nære Juvvasshøe.

Nedbør

Store deler av landet klassifiseres som «Normalt, tørr» eller «Normalt, våt». Men det er ganske store regionale forskjeller. Deler av Vestlandet, samt deler av Trøndelag og Finnmark, klassifiseres som «Vått», «Svært vått» eller «Ekstremt vått», mens deler av Sør-Østlandet og enkelte deler av Nord-Norge klassifiseres som «Tørt» eller «Svært tørt». Landsnedbøren var 10 % mer enn normalt. I serien som går tilbake til 1901 er september 2018 våtest med 64 % mer nedbør enn normalt, mens 1993 er tørrest med 53 % mindre nedbør enn normalt.

Det ble slått 17 rekorder for nedbør. Se rekordtabellen bakerst i rapporten.

De våteste stasjonene var:

- 50865 Gullfjellet (Bergen, Vestland) 605,7 mm (75% mer nedbør enn normalt)
- 52930 Brekke i Sogn (Gulen, Vestland) 537,7 mm (56 % mer nedbør enn normalt)
- 46850 Hundseid i Vikedal (Vindafjord, Rogaland) 508,4 mm (60 % mer nedbør enn normalt)

Gjennomsnittet av største månedsnedbør i september i normalperioden 1991-2020 er 474 mm.

De tørreste stasjonene var:

- 25200 Gol - Botnen (Gol, Buskerud) 19,4 mm (ingen normal ennå)
- 23420 Fagernes (Nord-Aurdal, Innlandet) 21,2 mm (62 % mindre nedbør enn normalt)
- 24960 Gol - Stake (Gol, Buskerud) 21,5 mm (58 % mindre nedbør enn normalt)

Høyeste døgnnedbør var 98,4 mm, og ble registrert den 20. på 50351 Samnanger II (Samnanger, Vestland). Gjennomsnittet av største døgnnedbør i september i normalperioden 1991-2020 er 103 mm.

Snøforhold

Kartet som viser snøforholdene utgår i sommersesongen, men finnes på senorge.no.

Arktis

Lufttemperatur

99710 Bjørnøya var den varmeste stasjonen med et gjennomsnitt på 5,8 °C (1,7 °C over normalen). 99884 Klauva var kaldest med et gjennomsnitt på -0,5 °C (ingen normal ennå).

99840 Svalbard Lufthavn hadde en gjennomsnittstemperatur på 3,6 °C (1,6 °C over normalen). 99910 Ny-Ålesund hadde en gjennomsnittstemperatur på 2,3 °C (1,1 °C over normalen). 99950 Jan Mayen hadde en gjennomsnittstemperatur på 5,4 °C (0,9 °C over normalen). 99720 Hopen hadde en gjennomsnittstemperatur på 4,4 °C (2,0 °C over normalen). 99710 Bjørnøya hadde en gjennomsnittstemperatur på 5,8 °C (1,7 °C over normalen).


Månedens høyeste maksimumstemperatur var 10,8 °C, og ble målt 12. september på 99710 Bjørnøya. Den laveste minimumstemperaturen ble målt på 99884 Klauva den 30. september med -9,3 °C.

Nedbør


99720 Hopen registrerte mest nedbør av de arktiske stasjonene med 75,9 mm (123 % mer nedbør enn normalt). 99870 Adventdalen var tørrest med 16,2 mm (ingen normal ennå). 99720 Hopen målte størst døgnnedbør med 22,5 mm den 29. september.

Sjøis

I september ble sjøisens utbredelse i Arktis (figur 1) målt til 5.34 millioner km², noe som er den 16. laveste utbredelsen for september registrert med satellittmålinger¹ (figur 2a). Sammenlignet med referanseperioden defineres dette som en normal utbredelse. Rundt Svalbard er isutbredelsen nå 0.24 millioner km², noe som er den 18. laveste utbredelsen i dette området for september (figur 2b).




Sjøisindeks, versjon 3.0 - Klimakart (OSI-420-a | 2026)
Datakilde: Sjøiskonsentrasjon 2026 (OSI-438AFT, AMSR3); Klimatologi (OSI-450-a1, SMR-SSM/I-SSMIS)




Sjøisindeks, versjon 3.0 - Klimakart (OSI-420-a | 2026)
Datakilde: Sjøiskonsentrasjon 2026 (OSI-438AFT, AMSR3); Klimatologi (OSI-450-a1, SMR-SSM/I-SSMIS)

Figur 1: Til venstre: Sjøiskonsentrasjonen i Arktis for september 2026, der blått representerer åpent hav og hvitt representerer 100 % isdekke. Den oransje konturen markerer den midterste isutbredelsen (medianen) for perioden 1991–2020. Til høyre: Avvik i iskonsentrasjon, angitt i prosent, fra referanseperioden 1991–2020. Røde områder har mindre is enn normalt, mens blå områder har mer. Den lille boksen indikerer Svalbardregionen, som vises i figur 2b.



(a) Arktis



(b) Svalbardområdet


Figur 2: Sjøisutbredelsen (a) i Arktis og (b) i Svalbardområdet for september i perioden 1979–2026. Trenden er beregnet relativt til referanseperioden 1991–2020. Svalbardområdet er markert på kartet i figur 1.

¹Vi har satellittobservasjoner av sjøis tilbake til oktober 1978.


Antarktis

Sjøis

På den sørlige halvkule (figur 3) ble sjøisutbredelsen for september målt til 17.77 millioner km², noe som er den 3. laveste utbredelsen som er registrert for september. Sammenlignet med referanseperioden defineres dette som en ekstremt lav utbredelse (figur 4a). I havområdet utenfor Dronning Maud Land er isutbredelsen nå 4.57 millioner km², noe som er den 11. laveste utbredelsen i dette området for september (figur 4b).




Sjøisindeks, versjon 3.0 - Klimakart (OSI-420-a | 2026)
Datakilde: Sjøiskonsentrasjon 2026 (OSI-438AFT, AMSR3); Klimatologi (OSI-450-a1, SMMR-SSM/I-SSMIS)




Sjøisindeks, versjon 3.0 - Klimakart (OSI-420-a | 2026)
Datakilde: Sjøiskonsentrasjon 2026 (OSI-438AFT, AMSR3); Klimatologi (OSI-450-a1, SMMR-SSM/I-SSMIS)

Figur 3: Til venstre: Sjøiskonsentrasjonen i Antarktis for september 2026, der blått representerer åpent hav og hvitt representerer 100 % isdekke. Den oransje konturen markerer den midterste isutbredelsen (medianen) for perioden 1991–2020. Til høyre: Avvik i iskonsentrasjon, angitt i prosent, fra referanseperioden 1991–2020. Røde områder har mindre is enn normalt, mens blå områder har mer. De grå områdene inn mot land representerer isbremmer. Den lille boksen indikerer havområdet utenfor Dronning Maud Land, som vises i figur 4b.



(a) Antarktis



(b) Dronning Maud Land sektor

Figur 4: Sjøisutbredelsen (a) i Antarktis og (b) i en sektor utenfor Dronning Maud Land for september i perioden 1979–2026. Trenden er beregnet relativt til referanseperioden 1991–2020. Sektoren utenfor Dronning Maud Land er markert på kartet i figur 3.

Se oppdaterte grafer av sjøisen på METs kryosfære-website: <https://cryo.met.no/nb/sjoe-is-indeks>

Rekorder

Data fra vær- og nedbørstasjoner som rapporterer daglig, og som har vært i drift femten år eller mer. "Start" angir første år med lokale septembermålinger.

Stasjoner med ny månedsrekord for høy døgnetnedbør

Stnr	Navn	Kommune	Start	Rekord	Tid	Forrige	Forrige tid
53530	Midtstova	Ulvik (Vestland)	2011	72,3 mm	20.09.2026	61,9 mm	15.09.2019
55300	Skjolden	Luster (Vestland)	2011	47,6 mm	20.09.2026	44,9 mm	27.09.2014
55550	Hafslo	Luster (Vestland)	1895	50,4 mm	20.09.2026	48,3 mm	26.09.2018
55820	Fjærland - Bremuseet	Sogndal (Vestland)	2005	55,5 mm	20.09.2026	52,8 mm	21.09.2023
58390	Innvik - Heggdal	Stryn (Vestland)	2005	48,8 mm	20.09.2026	40,2 mm	16.09.2019
58900	Stryn - Kroken	Stryn (Vestland)	2000	77,2 mm	20.09.2026	65,1 mm	26.09.2003
61420	Marstein	Rauma (Møre og Romsdal)	2010	61,6 mm	21.09.2026	49,1 mm	16.09.2019
82000	Setså	Saltdal (Nordland)	2009	41,4 mm	17.09.2026	36,9 mm	21.09.2013
89940	Dividalen II	Målselv (Troms)	2009	20,1 mm	17.09.2026	19,1 mm	19.09.2015
93140	Alta Lufthavn	Alta (Finnmark)	1963	46,8 mm	02.09.2026	31,4 mm	19.09.2012
93301	Suolovuopmi - Lulit	Kautokeino (Finnmark)	2004	38,4 mm	02.09.2026	31,1 mm	19.09.2015
93700	Kautokeino	Kautokeino (Finnmark)	1931	63,6 mm	03.09.2026	34,0 mm	18.09.1965

Stasjoner med ny månedsrekord for høy totalnedbør

Stnr	Navn	Kommune	Start	Rekord	Forrige	Forrige år
67780	Ålen	Holtålen (Trøndelag)	2012	121,7 mm	98,4 mm	2019
93301	Suolovuopmi - Lulit	Kautokeino (Finnmark)	2004	92,4 mm	64,4 mm	2019
93700	Kautokeino	Kautokeino (Finnmark)	1895	148,9 mm	121,2 mm	1932

Stasjoner med ny månedsrekord for lav totalnedbør

Stnr	Navn	Kommune	Start	Rekord	Forrige	Forrige år
7950	Rena Flyplass	Åmot (Innlandet)	2011	36,4 mm	43,6 mm	2014
31850	Hjartdal	Hjartdal (Telemark)	1995	37,1 mm	38,9 mm	2005