Meteorologisk institutt

No. 29/2026
METEOROLOGI
Bergen/Oslo/Tromsø,
30.10.2026
ISSN 1894-759X

METinfo

Hendelserapport

**Svært stor skogbrannfare april og juli/august 2026;
Svært stor skogbrannfare i Trøndelag 16.-23. april 2026, og
Svært stor skogbrannfare i deler av Agder og Telemark 23.-24. juli + 26. juli -5. august 2026.**

Forfattere: Geir Ottar Fagerlid, Lars Grinde og Håkon Mjelstad
Godkjent av avdelingsleder: Solfrid Agersten

Innhold

Sammendrag **2**

Værsituasjonen **3**

Farevarsler **13**

Svært stor skogbrannfare for deler av Trøndelag 16.-23 april 2026 13

Svært stor skogbrannfare i deler av Agder og Telemark 23.-24. juli & 26. juli - 5. august 2026 14

Lyn og skogbranner 15

Evaluering og observasjoner fra de aktuelle områdene **16**

Skader og infrastruktur 17

Skogbrannhelikopteret 17

Oppsummering **18**

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Sammendrag

I 2026 opplevde Norge to markante og geografisk adskilte perioder med svært stor skogbrannfare på oransje nivå. Den første inntraff uvanlig tidlig, i Trøndelag fra 16. til 23. april. Den andre var en mer langvarig og klassisk høysommerhendelse i deler av Agder og Telemark fra 23. juli til 5. august.

Til sammenligning var 2025-sesongen preget av en tørr senvår på Vestlandet sør for Stad (20.–25. mai) og en ekstremt varm og tørr høysommer i Trøndelag, på Vestlandet og i Nordland (16.–27. juli). Mens Trøndelag i mai 2025 opplevde ekstremt våte forhold som eliminerte tidlig brannfare, var situasjonen snudd på hodet i 2026 med en historisk varm og tørr tidligvår i Midt-Norge.

Skogbrannfare krever tørt og gjerne varmt vær over lengre tid, for at dette skal være aktuelt. Er det varslet (mye) vind i tillegg, gjør det at forholdene for skogbrannfare er ideelle.

Før utsendelse av farevarsel for gress-, lyng- eller skogbrannfare blir brannetater/brannsjefer kontaktet i aktuelle region(er), for å få en kvalifisert mening om det er nødvendig med et eventuelt farevarsel.

Varslingen av gress-, lyng-og skogbrannfare baseres mye på *indekser*[1], og er åpen for alle på skogbrannfare.met.no. Fargebruken på indeksen er ikke tilpasset farenivå, noe som gjør at blant annet media kan feiltolke fargen i indeksen som farge for farenivå.

[1] En indeks forenkler sammenligninger over tid og gjør det lettere å identifisere trender og avvik.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Værsituasjonen

De to hendelsene med svært stor skogbrannfare skjedde i henholdsvis april og juli/august. Det tar lang tid å tørke ut vegetasjonen og jordsmonnet, så det er naturlig å se på været minst en hel måned (i forkant) for å forklare hvorfor det var nødvendig med et farevarsel for skogbrann på oransje farenivå.

Klima i mars og april 2026

Temperatur

Mars


Klassifikasjonen viser at i Møre og Romsdal, det meste av Trøndelag og Nord-Norge var mars «Ekstremt varm». I resten av Sør-Norge var måneden hovedsakelig «Svært varm». Landstemperaturen endte 3,9 °C over normalen, og måneden ble den varmeste som er registrert i en måleserie som går tilbake til 1901.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 1: Klassifisering av temperatur mot persentiler i referanseperioden for mars 2026. Kilde: MET (https://www.met.no/publikasjoner/met-info)

April


Klassifikasjonen viser at i Nord-Norge var april for det meste «Svært varm» eller «Ekstremt varm». I Sør-Norge var måneden hovedsakelig «Varm» eller «Svært varm». Landstemperaturen endte 2,0 °C over normalen, og måneden ble, sammen med 2019, den nest varmeste april-måneden som er registrert i en måleserie som går tilbake til 1901. Avvikene i årets april varierte fra drøyt 3 °C over normalen på flere stasjoner i Nordland og Trøndelag.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 2: Klassifisering av temperatur mot persentiler i referanseperioden for april 2026. Kilde: MET (https://www.met.no/publikasjoner/met-info)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536


Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Nedbør

Mars

Klassifikasjonen varierte fra «Ekstremt vått» i deler av Nordland og Finnmark, samt noen mindre områder østafjells og på Vestlandet, til «Ekstremt tørt» i indre strøk av Trøndelag og lengst nord i Innlandet. Flere stasjoner i Innlandet, Trøndelag og Vestland fikk fra 15 til 30 % av normalen (70-85 % mindre nedbør enn normalt).



Figur 3: Klassifisering av nedbør mot persentiler i referanseperioden for mars 2026. Kilde: MET (https://www.met.no/publikasjoner/met-info)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no


Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

April

Klassifikasjonen varierte fra «Svært vått» i noen områder på Sørlandet og Østlandet, til «Svært tørt» og til dels «Ekstremt tørt» i deler av Finnmark. På landsbasis falt det 15 % mindre nedbør enn normalt. Måneden ble den 52. tørreste april-måneden som er registrert i måleserien som går tilbake til 1901.



Figur 4: Klassifisering av nedbør mot persentiler i referanseperioden for april 2026. Kilde: MET (https://www.met.no/publikasjoner/met-info)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no


Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Snøforhold

Per 1. april var det svært lite snø i Trøndelag, i likhet med store deler av landet.



Figur 5: Klassifisering av snøforhold, basert på vanninnhold, mot median per 1. april 2026. Kilde: MET (https://www.met.no/publikasjoner/met-info)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406


Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Klima i juli og august 2026

Temperatur

Juli

Store deler av Norge klassifiseres som «Normalt, kjølig» eller «Normalt, mild». Agder og Telemark ble definert som "varmt" eller "svært varmt". Landstemperaturen endte 0,1 °C under normalen. I denne serien er juli 2018 varmest med 3,3 °C over normalen, mens 1902 er kaldest med 3,7 °C under normalen.



Figur 6: Klassifisering av temperatur mot persentiler i referanseperioden for juli 2026. Kilde: MET (https://www.met.no/publikasjoner/met-info)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no


Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

August

Generelt for hele landet er det "Normalt kjølig/mildt" til "Svært kaldt" (indre områder i Sogn og Fjordane og på Fosen), unntak for noen mindre områder i indre Telemark og i Finnmark, som klassifiseres som "Varmt". Temperaturavvik, TAMA, for landet sett under ett: 0,5 grader under normalen, den 56. varmeste august i måleserien som går tilbake til 1901. Ingen fylker eller temperatur-regioner utpeker seg som spesielt varme eller kalde, det er jevnt over kjølig "midt på treet" i august.



Figur 7: Klassifisering av temperatur mot persentiler i referanseperioden foraugust 2026. Kilde: MET (https://www.met.no/publikasjoner/met-info)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536


Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Nedbør

Juli

Det er store regionale forskjeller i Norge i juli. Agder og Telemark er hovedsakelig definert som "svært tørt" eller "ekstremt tørt". Andre deler av landet er definert som "svært vått" eller"ekstremt vått". Landsnedbøren var 2 % under normalen.



Figur 8: Klassifisering av nedbør mot persentiler i referanseperioden for juli 2026. Kilde: MET (https://www.met.no/publikasjoner/met-info)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no


Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

August

I august er det for nedbør et 3-delt Norge med "Normalt tørt", "Tørt" og "Svært tørt" vær på Østlandet sør for Dovre og øst for Langfjella, "Normalt vått" til "Ekstremt vått" på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland og relativt normalt og tørt nord for Nordland.



Figur 9: Klassifisering av nedbør mot persentiler i referanseperioden for juli 2026. Kilde: MET (https://www.met.no/publikasjoner/met-info)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Farevarsler

Svært stor skogbrannfare for deler av Trøndelag 16.-23 april 2026

Mai 2025 var langvarig tørr og med lite nedbør. Det første varselet i denne hendelsen ble sendt 14. mai, og oppgradert til oransje farenivå 20. mai. Den 25. mai var hendelsen over. At det blir sendt farevarsel for gress-, lyng- og skogbrannfare en gang i løpet av vårmånedene skjer nesten hvert år, og henger sammen med at det er mye dødt og lett antennelig organisk materiell tilgjengelig etter vinteren. Blir i tillegg vårsesongen varm og tørr, er det ekstra alvorlig. Skogbrannfaren går over når det har falt nedbør, og enger og trær blir skikkelig grønne. Totalt 4 farevarsler ble publisert i denne hendelsen.


Figur 1 viser at lufttemperaturen var svært eller ekstremt varm i store deler av Vestland. Spesielt varmt og tørt var det i gyldighetsperioden til det oransje farevarselet. Figur 2 viser at mai var "normalt våt" på deler av Vestlandet sør for Stad, men tørrere enn normalt i ytre strøk.

Utstedt 16. april kl 10:39

Skogbrannfare, gult nivå (MET), for deler av Trøndelag. Gyldig: fra 16.04.2026 10:39:00 til 23.04.2026 11:00

Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Vegetasjonen kan svært lett antennes: Veldig store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter.



Figur 10: Illustrasjon vedlagt farevarselet for svært stor gress- og lyngbrannfare i mars 2026

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Svært stor skogbrannfare i deler av Agder og Telemark 23.-24. juli & 26. juli - 5. august 2026

Denne værhendelsen var langvarig, slik det ofte er når det gjelder situasjoner med "svært stor skogbrannfare". Slike faregrader vedvarer gjerne over tid, fordi det kreves betydelige mengder nedbør over større områder for å redusere faren. Om våren og sommeren kan det ta lang tid før slike mengder nedbør faktisk inntreffer. Figur 3 og Figur 4 viser at juli var uvanlig varm og tørr mange steder i år.

De oransje farevarslene var gyldige fra 16. juli til 27. juli. Tar man med de gule farevarslene, varte hendelsen totalt fra 14. juli til søndag 3. august.


I løpet av denne perioden ble det sendt over 40 farevarsler, inkludert førstevarsler, oppgraderinger og nedgraderinger. Det høye antallet utsendelser skyldes ønsket om å gi mest mulig detaljerte og oppdaterte varsler til brukerne gjennom hele perioden.

Utstedt 23. juli kl 16:45

Skogbrannfare, oransje nivå (MET), for deler av Agder. Gyldig: fra 23.07.2026 16:45 til 24.07.2026 23:59

Lokalt stor skogbrannfare til det kommer nedbør av betydning

Vegetasjonen kan svært lett antennes: Veldig store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter.



Figur 11: Illustrasjon vedlagt farevarselet for svært stor gress- og lyngbrannfare i juli 2026

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406


Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Utstedt 26. juli kl 10:0

Skogbrannfare, oransje nivå (MET), for deler av Agder. Gyldig: fra 23.07.2026 16:45 til 24.07.2026 23:59

Det er stor skogbrannfare. Det vil komme noe nedbør, som kan minke faren midlertidig, men vegetasjonen tørker fort opp igjen. Stor skogbrannfare vedvarer inntil det har kommet tilstrekkelig nedbør.

Vegetasjonen kan svært lett antennes: Veldig store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter.



Figur 12: Illustrasjon vedlagt farevarselet for svært stor gress- og lyngbrannfare i juli/august 2026

Lyn og skogbranner

Skogbranner kan ofte oppstå som følge av lynnedslag, og det skyldes først og fremst den enorme varmen lynet fører med seg. Et lyn kan bli over 30 000 grader varmt, og når det treffer et tre, bakken eller tørr vegetasjon, kan denne varmen være nok til å antenne gress, barnåler eller blader på stedet. Risikoen blir særlig stor når skogen er tørr etter en periode med lite nedbør, for da fungerer vegetasjonen som lettantennelig drivstoff for ilden.

Ofte forbinder vi lyn med regn, men i noen tilfeller kan tordenvær gi lyn uten at nedbøren når bakken. Da uteblir den naturlige dempende effekten regnet vanligvis har, noe som gjør faren for

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

brann enda større. Når lyn treffer et tre, kan det dessuten oppstå glør eller ulming inne i stammen eller i skogbunnen, og brannen kan utvikle seg sakte i det skjulte før den plutselig sprer seg raskt når forholdene er gunstige med varme og vind. Lyn er en vanlig årsak til skogbranner.

Evaluering og observasjoner fra de aktuelle områdene

Å vurdere i etterkant hvor godt et skogbrannfarevarsel har «truffet», er krevende av flere grunner. For det første vet vi ikke hvor mange som faktisk tar hensyn til varselet og eventuelt endrer atferd som følge av det. Dersom det ikke oppstår brann, kan det skyldes at forholdene i utgangspunktet ikke var tilstrekkelig farlige, men det kan også skyldes at varselet førte til økt aktsomhet og dermed bidro til å forhindre en brann. Det er derfor vanskelig å avgjøre om et varsel var unødvendig, eller om det faktisk hadde en forebyggende effekt.

For det andre vet vi ikke hvordan situasjonen ville ha utviklet seg dersom farevarselet ikke hadde blitt sendt ut. Vi mangler med andre ord et "kontrolleksperiment", en sammenlignbar situasjon der det ikke ble varslet, men der øvrige forhold var de samme. Uten en slik sammenligning er det vanskelig å måle den faktiske effekten av varslingen.

Brannfaren påvirkes dessuten av en rekke lokale og tilfeldige faktorer. Små gnister, menneskelig aktivitet, vindkast, fuktighetsforhold og lokale regnbyger kan være avgjørende for om en brann oppstår og hvordan den utvikler seg. Dette gjør det utfordrende å sammenholde farevarselet med det faktiske antallet branner på en presis måte.

Kort sagt har farevarsler for skogbrannfare en **forebyggende hensikt**. Nettopp fordi varslingen kan bidra til at alvorlige hendelser ikke oppstår, blir det paradoksalt nok vanskelig å dokumentere effekten i etterkant. Et fravær av branner betyr ikke nødvendigvis at varselet var feil eller unødvendig, det kan også være et resultat av at varslingen har bidratt til økt aktsomhet og forebyggende tiltak.

MET har mye dialog med lokale brannvesen, som gir svært viktig innblikk i arbeidet MET har med å utforme farevarsel for skogbrannfare.

Brannstatistikk som grunnlag for evaluering


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeider ukentlig en oversikt over registrerte branner i innmark og utmark. På www.brannstatistikk.no er det mulig å søke i brannstatistikk flere år tilbake i tid og blant annet filtrere på tidspunkt, årsak og type brann. Det er særlig kategoriene **«gress- og innmark»** og **«skog- og utmark»** som er relevante ved vurdering av gress-, lyng- og skogbranner.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 13: Eksempel på brannstatistikk (uke 30) fra www.brannstatistikk.no

Statistikken gir dermed en oversikt over hvor mange branner som faktisk er registrert i en gitt periode. Den sier imidlertid ikke i seg selv noe om **hva som er et normalt antall branner** for et bestemt område på en bestemt tid av året. For å kunne vurdere om et skogbrannfarevarsel har «truffet», må antall registrerte branner derfor sees i sammenheng med historiske data og forventet brannaktivitet under tilsvarende vær- og tørkeforhold.

For en oversikt over registrerte branner i 2026 viser vi til www.brannstatistikk.no.

Skader og infrastruktur

De fleste brannene i disse hendelsene utviklet seg lite og ble "slått ned" av det lokale brannvesenet.

Skogbrannhelikopteret

DSB har ansvar for skogbrannhelikopterberedskapen i Norge. DSB setter inn ekstra skogbrannhelikopter ved behov, spesielt når det er økt fare for gress-, lyng- og skogbranner. Basert på ukesprognoser fra MET, fordeler DSB helikopterne etter hvor skogbrannfaren ventes å være størst. Selve bruken av helikoptrene koordineres av Hovedredningssentralen.

Lokale brannvesen kan få hjelp av disse helikopterne ved behov. Helikoptrene er utstyrt med "bøtter" som kan slippe store mengder vann over brannene, noe som er en effektiv metode for å slukke dem.

24 juli skriver DSB i en nyhetssak https://www.dsb.no/aktuelt/skogbrannfare/ at de har hatt 48 helikopter utrykninger så langt.

24.juli var det også storbrann i Krogstadelva hvor det var stor innsats fra beredskapen og helikopterne: https://www.dsb.no/aktuelt/beredskaps-norge-mobiliserte-i-krokstadelva/

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Mediaklipp

NRK lanserte en skogbrann- og skogbrannfarestream: https://www.nrk.no/nyheter/skogbrann-og-skogbrannfare-1.11150985 Denne viser til skogbranner også andre steder enn i Norge.

8.juli, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har satt åtte helikoptre i brannberedskap https://www.nrk.no/artikkel/frykter-skogbrann-setter-sju-ekstra-helikoptre-i-beredskap-1522436

13.juli Skogbrann i Bamble: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/skogbrann-i-bamble-1.17957051

Oppsummering

Formålet med skogbrannvarsling er å gi et tidlig og felles bilde av brannfaren, slik at publikum, beredskapsaktører og myndigheter kan iverksette forebyggende tiltak og være bedre forberedt dersom en brann oppstår. Verdien av varslingen ligger derfor ikke bare i å forutsi hvor mange branner som vil oppstå, men i å bidra til at branner forebygges, at beredskapen tilpasses risikoen, og at eventuelle branner håndteres raskt.

I 2026 har det vært to skogbrannhendelser med oransje farenivå, som ble godt varslet, der hendelsen i juli og august var mest omfattende og langvarig. Oppbyggingen bak begge hendelsene var forårsaket av tørt og varmt vær, og vind som fjerner fuktighet fra bakken. Ved begge hendelsene var det lett å verifisere at jordsmonnet og vegetasjonen var tørr og at branner svært lett kunne antennes.

I denne rapporten for årets skogbrannsesong er det ikke fokusert på de tilhørende gule farevarslene for skogbrann. For den andre hendelsen i juli/augst, ble det første gule farevarselet for skogbrannfare publisert 9. juli og de siste gule farevarslene for hendelsen var gyldig til 27. august. Det betyr at et farevarsel for skogbrann ofte er svært langvarige hendelser. På den ene side kan det for noen gjøre at man blir "blind" for varslet når det står lenge over tid, men på den andre siden kan det å oppheve eller nedgradere et skogbrannfarevarsel gjøre at enkelte blir uforsiktige; og dermed øker antall branner igjen. MET sin tilnærming til langvarige farevarsel for skogbrannfare, er å ha åpenhet rundt de underliggende meteorologiske faktorene og de fysiske faktum som ligger bak tørr vegetasjon.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191